Ontario

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURA

Essais de rendement des haricots de grande culture en 2007

La présente fiche renferme les résultats à jour des essais menés sur les cultivars de haricot de grande culture. Ces renseignements ont été recueillis par le Comité ontarien des légumineuses à grain et révisés par le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario.

Références

Pour plus de détails, communiquer avec :

Chris Gillard, Collège de Ridgetown, Université de Guelph
519 674-1632
cgillard@ridgetownc.uoguelph.ca

Brian Hall, MAAARO, Stratford, (519) 271-0083
brian.hall@ontario.ca

Tableau 1. Rendements des cultivars de haricots blancs

Régions à saison longue ou moyenne1

Cultivar3	Précocité (jours)	Rendement4 (t/ha)
AC Compass	90	3,56
Galley	94	3,56
OAC Thunder	94	3,75
AC Mast	95	3,59
AC Cruiser	95	3,52
T9905	97	3,97
OAC Silvercreek	97	3,64
AC Trident	97	3,55
Nautica	97	3,81
OAC Gryphon	98	3,77
Vista	98	3,65
OAC Rex	99	3,65
Scepter	102	3,88

Régions à saison courte2

Cultivar3	Précocité (jours)	Rendement4 (t/ha)
AC Compass	98	3,38
OAC Thunder	99	3,19
Galley	99	2,92
Kippen	99	2,63
AC Cruiser	105	3,09
AC Mast	106	3,32
OAC Gryphon	106	3,10
AC Trident	107	3,23
OAC Rex	109	3,11

1 Le rendement et la précocité sont basés sur la moyenne de 7 essais réalisés en 3 endroits

(Kippen, St. Thomas et Granton) pendant 3 ans (2004-2006). Pour une représentation graphique des résultats, voir la figure 1. Droite de régression rendement-précocité pour les cultivars de haricots blancs de pleine saison et de saison moyenne.


2 Le rendement et la précocité sont basés sur la moyenne de 6 essais en 3 endroits (Brussels, Elora et Winchester) pendant 3 ans (2004-2006). Pour une représentation graphique des résultats, voir la figure 2., Droite de régression rendement-précocité pour les cultivars de haricots blancs de courte saison.

3 Les cultivars de haricots blancs sont groupés selon leur précocité. La précocité de la plupart des cultivars diffère d'une région à l'autre en raison de différences environnementales.


4 1 t/ha = 893 lb/ac.

| Top of Page |

" Figure 1 - Droite de régression rendement-précocité pour les cultivars de haricots blancs de pleine saison et de saison moyenne



" Figure 2 - Droite de régression rendement-précocité pour les cultivars de haricots blancs de courte saison



" Tableau 2. Caractéristiques des cultivars de haricots blancs et fournisseurs

Cultivar	Poids de 100 graines (g)	Réaction aux maladies1			Aptitude à la récolte directe	Fournisseur
		Virus de la mosaïque	Anthracnose2	Moisissure blanche3		